

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Kadar CTX-1 serum pada pasien artritis reumatoid aktivitas ringan adalah 1,13 (0,1 - 11,74) ng/ml sedangkan pada pasien artritis reumatoid aktivitas sedang berat adalah 6,26 (0,56 - 34,69) ng/ml.
2. Kadar TNF- α serum pada pasien artritis reumatoid aktivitas ringan adalah 28,93 (12,20 - 191,27) pg/ml sedangkan pada pasien artritis reumatoid aktivitas sedang berat adalah 135,46 (14,72 - 358,68) pg/ml.
3. Kadar IL-1 serum pada pasien artritis reumatoid aktivitas ringan adalah 11,06 (5,12 - 39,8/7) pg/ml sedangkan pada pasien artritis reumatoid derajat sedang berat adalah 14,57 (5,12 - 153,38) pg/ml.
4. Kadar CTX-1 serum lebih tinggi secara bermakna pada pasien artritis reumatoid aktivitas sedang berat dibandingkan dengan pasien artritis reumatoid aktivitas ringan
5. Kadar TNF- α serum lebih tinggi secara bermakna pada pasien artritis reumatoid aktivitas sedang berat dibandingkan dengan pasien artritis reumatoid aktivitas ringan
6. Kadar IL-1 serum lebih tinggi secara bermakna pada pasien artritis reumatoid aktivitas sedang berat dibandingkan dengan pasien artritis reumatoid aktivitas ringan.

7.2 Saran

Perlu dipertimbangkan pemeriksaan CTX-1, TNF- α dan IL-1 untuk menilai aktivitas penyakit pasien artritis reumatoid.

