

**FAKTOR- FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN
PERDARAHAN POSTPARTUM PADA IBU BERSALIN
DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN**

TESIS

OLEH :



- 1. dr. Syahredi S. Adnani, Sp.OG (K)**
- 2. Dr. dr. Irza Wahid, Sp.PD-KHOM., FINASIM**

PROGRAM STUDI S2 IL PEMBIMBING :

- 1. dr. SYAHREDI S. ADNANI, Sp.OG (K)**
Dr. dr. IRZA WAHID, Sp.PD-KHOM., FINASIM MU KEBIDANAN
PASCASARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2019



ABSTRAK

FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM PADA IBU BERSALIN DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

Deffi Uprianti Bakri

Penyebab kematian ibu terbesar yaitu perdarahan, lebih dari separuh jumlah seluruh kematian ibu terjadi karena perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum juga disebabkan oleh beberapa faktor risiko yaitu umur, jumlah paritas, jarak antar kelahiran, riwayat persalinan sebelumnya, lama partus, lama lepasnya plasenta, anemia, pengetahuan ibu, perilaku ibu, kunjungan ANC. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian perdarahan postpartum.

Penelitian ini menggunakan metode analitik restropektif dengan pendekatan *Case Control Study* terhadap 58 ibu yang bersalin di wilayah kerja dinas kesehatan Kabupaten Merangin yang terdiri dari kasus dan control. Sampel dipilih secara *simple random sampling*. Analisis dari hasil uji statistik menggunakan uji *Chi-Square* untuk dapat menyimpulkan adanya hubungan dua variabel bermakna atau tidak bermakna.

Hasil uji *chi square* menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara umur (p: 0,001, OR: 3,63; CI: 1,686-7,843), paritas (p: 0,000, OR: 5,971; CI: 2,658-13,413), jarak kelahiran (p: 0,000, OR: 5,388; CI: 2,433-11,933), riwayat persalinan (p: 0,001, OR: 3,610; CI: 1,679-7,763), riwayat anemia (p: 0,000, OR: 4,249; CI: 1,950-9,258) dan pengetahuan (p: 0,003, OR: 3,109, CI: 1,457-6,634) dengan kejadian perdarahan post partum. Selanjutnya, paritas merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian perdarahan post partum dengan nilai $Exp(B) : 16.112$.

Kesimpulan penelitian ini yaitu ibu hamil dengan paritas berisiko akan meningkatkan kejadian perdarahan postpartum, oleh karena itu diharapkan kepada tenaga kesehatan untuk dapat meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga berencana dengan jumlah yang aman untuk persalinan berikutnya.

Kata Kunci : Perdarahan postpartum, faktor penyebab

ABSTRACT

FACTORS RELATED TO THE INCIDENCE OF POSTPARTUM BLEEDING IN MATERNITY MOTHERS IN THE WORKING AREA OF MERANGIN DISTRICT HEALTH OFFICE

Deffi Uprianti Bakri

The biggest cause of maternal mortality is bleeding, more than half the total number of maternal deaths occurs due to postpartum bleeding. Postpartum bleeding is also caused by several risk factors i.e. age, number of parity, the distance between births, history of previous labor, old Partum, prolonged release of placenta, anemia, mother's knowledge, maternal behavior, visit ANC. The Research Objectives are to figure out the factors related to the incidence of postpartum bleeding.

This research uses a method of analytical methods with the Case Control Study approach of 58 mothers who maternity in the work area of Merangin District health Office consisting of cases and Control. Samples were selected by simple random sampling. Analysis of statistical test results using the Chi-Square test to conclude the relationship between two or no meaningful variables.

The Chi square test results show there is a meaningful relationship between age (p: 0.001, OR: 3.63; CI: 1,686-7,843), Parity (p: 0.000, OR: 5.971; CI: 2,658-13,413), Birth distance (p: 0.000, OR: 5.388; CI: 2,433-11,933), Maternity history (p: 0.001, OR: 3.610; CI: 1,679-7,763), a History of anemia (P: 0.000, OR: 4,249; CI: 1,950-9,258) and knowledge (P: 0.003, OR: 3.109, CI: 1,457-6,634) with the occurrence of post partum bleeding. Furthermore, parity is the most dominant factor associated with the incidence of post partum bleeding with the value EXP (B): 16.112.

The conclusion of this research is that pregnant women with a risky parity will increase the incidence of postpartum hemorrhage, therefore expected to healthcare personnel to be able to improve education to the public about family planning with a safe amount.

Keywords: postpartum Bleeding, causal factors