

**HUBUNGAN PARITAS DENGAN TERJADINYA TERDUGA
DEPRESI POSTPARTUM DI PUSKESMAS KOTA PADANG**



**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2019**

**BACHELOR OF MIDWIFERY PROGRAM
FACULTY OF MEDICINE ANDALAS
UNIVERSITY**

Undergraduate These, December 2019

**LEILAN PINGESTU SARAGIH, No.BP.1610333002
ASSOCIATION BETWEEN PARITY AND THE SUSPECT OF POSTPARTUM
DEPRESSION IN HEALTHCARE FACILITIES AT PADANG CITY**

xii+ 71 pages, 5 tables, 3 images, 10 attachments

ABSTRACT

Background and Research Purpose

Postpartum depression is a condition of women having major emotional change after giving birth. The symptoms of postpartum depression are mother feeling worthless, guilty, insomnia, hypersomnia, fatigue, appetite changes, decreased concentration, and the desire to commit suicide. Postpartum depression affect she doesn't have ability to take care her self and her baby. The main goal of this study to know relationship between parity and the suspect of postpartum depression in healthcare facilities at padang city.

Method

This research was comparative analytical observational study with cross-sectional comparative design. Data was analyzed using Chi-Square test to find association between variables. The sample size was 46 persons; 23 primiparas and 23 multiparas, selected as the inclusion and exclusion criteria. Edinburgh Postnatal Depression Scale was used questionnaire.

Results

The study found that 60.9% primiparas was suspect of postpartum depression while the same applied to 56,5% of multiparas.

Conclution

There is no association between parity and the suspect of postpartum depression p value 0,765 ($p > 0,05$).

Bibliography : 49 (2007-2019)

Keywords : Postpartum Depression, Parity, Primiparas, Multiparas, EPDS.

**PROGRAM S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Desember 2019

**LEILAN PINGESTU SARAGIH, No.BP 1610333002
HUBUNGAN PARITAS DENGAN TERJADINYA TERDUGA DEPRESI
POSTPARTUM DI PUSKESMAS KOTA PADANG**

xii+71 halaman, 5 tabel, 3 gambar, 10 lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Depresi postpartum adalah suatu kondisi ketika ibu mengalami gangguan adaptasi psikologis setelah melahirkan. Depresi postpartum menimbulkan gejala seperti ibu merasa tidak berharga, merasa bersalah, insomnia, hypersomnia, kelelahan, perubahan nafsu makan, penurunan konsentrasi, adanya keinginan untuk bunuh diri. Depresi postpartum akan menyebabkan ibu tidak mampu merawat diri dan bayinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan paritas dengan terjadinya terduga depresi postpartum di Puskesmas Kota Padang.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik komparatif dengan desain *cross sectional comparative* dan menggunakan uji *Chi-Square* untuk melihat hubungan kedua variabel diatas. Sampel penelitian ini berjumlah 46 orang dengan 23 orang primipara dan 23 orang multipara yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *Edinburgh Postnatal Depression Scale* dengan angket.

Hasil

Hasil penelitian didapatkan sebanyak 60,9% responden primipara terduga mengalami depresi postpartum. Sebanyak 56,5% responden multipara.

Kesimpulan

Tidak ada hubungan paritas dengan terjadinya terduga depresi postpartum *p value* 0,765 ($p>0,05$).

Daftar Pustaka : 49 (2007-2019)

Kata kunci : Depresi Postpartum, Paritas, Primipara, Multipara, EPDS.