

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan preeklamsia dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di RSIA Siti Hawa maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sebagian besar responden melahirkan bayi dengan berat badan lahir normal.
- 2) Terdapat hubungan yang bermakna antara preeklamsia dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di RSIA Siti Hawa.

7.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR).
- 2) Ibu hamil disarankan untuk memeriksakan kandungannya dengan rutin terutama yang memiliki risiko tinggi terhadap preeklamsia dan berat badan lahir rendah (BBLR).
- 3) Tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan penyuluhan kesehatan dan konseling tentang faktor risiko terjadinya preeklamsia dan efek yang dapat terjadi pada janin seperti BBLR.