

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pasien *Primary Angle Closure Glaucoma* (PACG) di Poliklinik Mata RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016-2019, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar pasien PACG berusia  $\geq 40$  tahun.
2. Sebagian besar pasien PACG adalah berjenis kelamin perempuan.
3. Sebagian besar pasien PACG adalah tidak dilakukan koreksi kacamata, namun kelainan refraksi hipermetropia didapatkan lebih banyak dari miopia.
4. Sebagian besar pasien PACG memiliki tekanan intraokular  $> 21$  mmHg.
5. Hampir semua pasien PACG tidak memiliki riwayat keluarga.
6. Kedalaman *anterior chamber* pada sebagian besar pasien PACG adalah Van Herick grade 2.
7. Sebagian besar pasien mengalami kebutaan akibat PACG. Buta unilateral lebih banyak dibandingkan buta bilateral.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tenaga kesehatan sebaiknya melakukan deteksi dini *Primary Angle Closure Glaucoma* (PACG) pada kepada masyarakat yang berisiko, sehingga dapat mencegah progresifitas dan kebutaan akibat PACG.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor risiko *Primary Angle Closure Glaucoma* (PACG) dengan desain *case control*.