

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Rata – rata berat badan bayi *pre test* pada kelompok kontrol adalah 7130 gr dengan standar deviasi 826.035, nilai terendah 5900 gr dan nilai tertinggi 8300 gr.
2. Rata – rata berat badan bayi *post test* pada kelompok kontrol adalah 7390 gr dengan standar deviasi 710.946, nilai terendah 6300 gr dan nilai tertinggi 8500 gr.
3. Rata – rata berat badan bayi *pre test* pada kelompok eksperimen adalah 7910 gr dengan standar deviasi 940.981 , nilai terendah 6500 dan nilai tertinggi 9300 gr.
4. Rata – rata berat badan bayi *post test* pada kelompok eksperimen adalah 8420 gr dengan standar deviasi 915.363, nilai terendah 7000 gr dan nilai tertinggi 9800 gr.
5. Terdapat perbedaan rata-rata berat badan pos-test antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yaitu 1030 gr.
6. Ada pengaruh pijat bayi terhadap kenaikan berat badan pada bayi usia 6-12 bulan di Puskesmas Seberang Padang.

7.2 Saran

1. Kepada Puskesmas Seberang Padang

Disarankan kepada petugas kesehatan Puskesmas Seberang Padang yaitu ahli gizi, bidan dan perawat yang terlibat dalam posyandu di Puskesmas Seberang Padang, untuk menjadikan pijat bayi sebagai salah satu program inovasi dalam stimulasi tumbuh kembang secara rutin di Posyandu.

2. Kepada Masyarakat

Disarankan kepada masyarakat yang mempunyai bayi untuk melakukan pemijatan pada bayi sebagai salah satu upaya meningkatkan berat badan bayi.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang manfaat lain dari pemijatan bayi seperti pengaruh pijat bayi terhadap penurunan kejadian kolik pada bayi.

