

UNIVERSITAS ANDALAS

**HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA DAN POLA
ASUH IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK
BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PADANG
PASIR KOTA PADANG TAHUN 2019**



**Pembimbing 1 : Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Pembimbing 2 : Dr. Denas Symond, MCN**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

2020



UNIVERSITAS ANDALAS

HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA DAN POLA
ASUH IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK
BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PADANG
PASIR KOTA PADANG TAHUN 2019

Oleh :

ANGGUN PRATIWI


No. BP. 1511212023

Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

2020



SKRIPSI, 02 Januari 2020

Anggun Pratiwi, No.BP. 1511212023

**HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN ORANG TUA DAN POLA ASUH
IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BALITA DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS PADANG PASIR KOTA PADANG TAHUN 2019**

X, + 85 halaman, 16 tabel, 3 Gambar, 9 lampiran

ABSTRAK

Tujuan

Prevalensi *Stunting* di Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar mengalami fluaktif yaitu pada tahun 2010 mencapai 35,6% kemudian meningkat tahun 2013 sebesar 37,2% dan terjadi penurunan tahun 2018 sebesar 30,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendapatan orang tua dan pola asuh ibu dengan kejadian *stunting* pada anak balita usia 0-24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Pasir Kota Padang

Metode

Penelitian ini menggunakan desain kasus kontrol *matching* umur dan jenis kelamin pada anak 0-24 bulan. Pengambilan sampel dilakukan dengan *cluster random sampling* pada 30 responden setiap kelompok. Data primer diperoleh dengan pengukuran tinggi badan menggunakan *lengthboard* dan *mikrotoice*, Data tingkat pendapatan diukur dengan menggunakan kuesioner dari study sebelumnya. Data pola makan anak, pola asuh psikososial anak, dan data pola kesehatan dan kebersihan diambil dengan wawancara langsung terhadap responden dengan kuesioner. Analisis menggunakan *Epi Info 7* uji statistik Mc Nemar tingkat kepercayaan (CI) 95%.

Hasil

Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara pola asuh psikososial $OR=19$ (95% CI 1,105-326,4), pola asuh kesehatan $OR=4,677$ (95% CI 1,341-16,239) dengan *stunting* pada anak balita usia 0-24 bulan.

Kesimpulan

Pola asuh psikososial dan pola asuh kesehatan merupakan faktor risiko kejadian *stunting* pada anak balita usia 0-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir. Diharapkan kepada petugas Puskesmas terutama pemegang gizi dan promosi kesehatan agar memberikan penyuluhan tentang pentingnya pola asuh yang baik, baik dalam pemantauan keadaan gizi dan penyakit yang dialami oleh anaknya.

Daftar Pustaka : 71 (1997-2019)

Keywords : Stunting, Tingkat Pendapatan , Pola Asuh Ibu

FACULTY OF COMMUNITY HEALTH ANDALAS UNIVERSITY

Undergraduate Thesis, 2nd Januari 2020

Anggun Pratiwi, No.BP. 1511212023

THE RELATIONSHIP OF PARENT INCOME LEVEL AND MOTHER PARENTING WITH STUNTING EVENTS IN CHILDREN AGE 0-24 MONTHS AT WORKING AREAS OF PADANG PASIR HEALTH CENTER, PADANG CITY IN 2019

X, +85 pages, 16 tables, 3 pictures, 9 attachments

ABSTRACT

Objective

Prevalence of Stunting in Indonesia based on data of Basic Health Research experienced a fluctuating effect in 2010 which reached 35.6%, then increased in 2013 by 37.2% and a decrease in 2018 by 30.8%. The study aims to determine the relationship of parents income level and mother parenting with stunting in children age 0-24 months in the work area of Padang Pasir Health Center, Padang City.

Method

The study used a case control design matching age and sex in children 0-24 months. Sampling was done by cluster random sampling with total 30 respondents in each group. Primary data were obtained by measuring height using lengthboard and microtoise, income level data were measured using a questionnaire from a previous study. Data on children's eating patterns, child psychosocial care patterns, and data on health and hygiene patterns were taken from previous studies with direct interviews with respondents with questionnaires. Analysis using *Epi Info* 7 statistical test McNemar's confidence level (CI) 95%.

Results

The analysis results showed the variables associated between The analysis showed an association between psychosocial care patterns OR = 19 (95% CI 1.105-326.4), health care patterns OR = 4.677 (95% CI 1.341-16.239) with stunting in children under the age of 0-24 months.

Conclusion

Psychosocial parenting and health parenting are risk factors for stunting in children under the age of 0-24 months in the working area of Puskesmas Padang Pasir. It is expected that Puskesmas staff, especially nutrition holders and health promotion providers, provide information on the importance of good parenting, both in monitoring the nutritional conditions and illness experienced by their children.

Reference: 71 (1997-2019)

Keywords: Stunting, Parent Income Level, Mother Parenting

