

## BAB 6 PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai gambaran faktor risiko yang mempengaruhi mortalitas dan morbiditas pada ibu hamil di Puskesmas Andalas Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Distribusi dan frekuensi ibu hamil berusia <20 tahun, yaitu 2.1%, dan ibu hamil berusia  $\geq 35$  tahun, yaitu 21.9%. Distribusi dan frekuensi ibu hamil yang memiliki tinggi  $\leq 145$  cm, yaitu 6.3% dan ibu hamil yang memiliki ukuran LiLA <23.5 cm, yaitu 11.5%.
2. Distribusi dan frekuensi ibu hamil yang menderita anemia, yaitu 9.4%, ibu hamil yang menderita hipertensi, yaitu 1% dan ibu hamil yang menderita diabetes melitus tipe 2, yaitu 1%
3. Distribusi dan frekuensi ibu hamil memiliki status paritas *grandmultipara*, yaitu 2.1% dan ibu hamil yang memiliki jarak kelahiran <2 tahun, yaitu 22.6%.
4. Distribusi dan frekuensi ibu hamil memiliki riwayat perdarahan pascapersalinan, yaitu 3.2%, ibu hamil dengan riwayat persalinan *preterm*, yaitu 9.7%, ibu hamil dengan riwayat persalinan menggunakan *forceps*, yaitu 1.6%, ibu hamil dengan riwayat persalinan menggunakan vakum, yaitu 6.5% dan ibu hamil dengan riwayat seksio sesarea, yaitu 45.2%.

### 6.2. Saran

Beberapa saran yang diberikan berdasarkan pengalaman dan pengamatan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Puskesmas Andalas untuk upaya penanganan dan menurunkan mortalitas dan morbiditas pada ibu dan bayi
2. Puskesmas Andalas disarankan untuk segera menggunakan Kartu Skor Poedji Rochajati sebagai alat deteksi dini risiko dalam kehamilan dan pihak Puskesmas Andalas juga disarankan untuk menggunakan alat USG yang

sudah tersedia sebagai alat bantu dalam skrining faktor risiko pada kehamilan.

3. Untuk Ibu hamil dengan faktor risiko diharapkan segera dirujuk oleh tenaga kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat 2.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan meneliti faktor lain yang mempengaruhi mortalitas dan morbiditas pada ibu hamil.
5. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan gambaran faktor risiko yang mempengaruhi mortalitas dan morbiditas pada ibu hamil antar Puskesmas

