


**HUBUNGAN *INSIGHT* DENGAN KEKAMBUHAN PADA ORANG DENGAN
SKIZOFRENIA DI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO
PROVINSI BENGKULU**

REPOSITORI

OLEH :

**JAJANG SURYANA
BP. 1721312050**



**Pembimbing I
Dr. Rika Sabri, SKp, M.Kes, Sp.Kep.Kom**

**Pembimbing II
Ns. Dewi Eka Putri, M.Kep, Sp.Kep.J**

**PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN
KEKHUSUSAN KEPERAWATAN JIWA
FAKULTAS KEPERAWATAN - UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2020**

**PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN
KEKHSUSAN KEPERAWATAN JIWA
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Tesis, Januari 2020
Jajang Suryana

Hubungan *Insight* Dengan Kekambuhan Pada Orang Dengan Skizofrenia Di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu Tahun 2019

xiii + 74 hal + 11 tabel + 2 bagan + 18 Lampiran



Tingginya angka kekambuhan merupakan permasalahan kesehatan jiwa saat ini. Kekambuhan pada orang dengan skizofrenia sering disebabkan oleh rendahnya *insight*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan *insight* dengan kekambuhan pada orang dengan skizofrenia yang dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Sampel diambil dengan cara total sampel dengan jumlah 109 orang. *Insight* diukur dengan menggunakan instrument *Schedul for Assessment of Insight Expand* (SAI-E) dan kekambuhan diukur dengan cara menilai berapa kali orang dengan skizofrenia mengalami kekambuhan dalam satu tahun terakhir. Hasil uji korelasi didapatkan ada hubungan *insight* (kesadaran akan penyakitnya, kemampuan mengenali gejala gangguan jiwa, dan kepatuhan terhadap pengobatan) dengan kekambuhan p value = 0,000. Rerata *insight* pada orang dengan skizofrenia 14,37 dan rerata kekambuhan 2,50. Rumah sakit hendaknya mengoptimalkan kembali Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Standar Asuhan Keperawatan (SAK) yang berlaku untuk menekan kekambuhan dan meningkatkan *insight*.

Kata kunci: Skizofrenia, *Insight*, Kekambuhan

Daftar pustaka: 74 (1990-2019)

**NURSING POST GRADUATE PROGRAM
SPECIALY IN MENTAL HEALTH NURSING
FACULTY OF NURSING, ANDALAS UNIVERSITY**

Thesis, January 2020
Jajang Suryana

The Insight Relationship With Relapse In People With Skizofrenia In Soeprapto Bengkulu Mental Hospital in 2019

xiii + 74 pages + 11 tables + 2 charts + 18 Attachments

The high relapse rate is a mental health problem today. Relapse in people with schizophrenia is often caused by low insight. This study aims to look at the relationship of insight with relapse in people with schizophrenia who are treated at the Soeprapto Bengkulu Mental Hospital. Type of quantitative research, cross sectional design. Samples were taken by a total of 109 people.. Insight is measured by using the Schedule for Assessment of Insight Expand (SAI-E) instrument and relapse is measured by assessing the number of times people with schizophrenia have had a relapse in the past year. The correlation test results found there is a relationship of insight (awareness of the illness, ability to recognize symptoms of mental disorders, and adherence to treatment) with relapse with a p value = 0,000. Average insight in people with schizophrenia 14.37 and average recurrence 2.50. Hospitals should re-optimize Operational Procedure Standards regarding Nursing Care Standards that apply to reduce relapse and increase insight.

Keywords: Schizophrenia, Insight, Relapse

References: 74(1990-2019)

