



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PERILAKU SADARI PADA MAHASISWI KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2020**

OLEH :

**MUSTIKA RAMADANI ILYAS
NO BP: 1711216025**

Pembimbing I : Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM

Pembimbing II : Dr. Mery Ramadani, SKM, MKM

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2020**


**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, April 2020

MUSTIKA RAMADANI ILYAS, NO. BP. 1711216025

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN SADARI
PADA MAHASISWI KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG TAHUN 2020**

viii + 90 halaman, 22 tabel, 7 gambar, 8 lampiran



ABSTRAK

Tujuan

Periksa payudara sendiri (SADARI) berperan penting dalam upaya deteksi dini kanker payudara, karena 95% benjolan payudara ditemukan oleh wanita itu sendiri. Menurut survey Yayasan Kesehatan Kanker Payudara, sebanyak 80% masyarakat Indonesia tidak mengerti pentingnya melakukan SADARI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan SADARI mahasiswa sebagai upaya deteksi dini kanker payudara di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang tahun 2020.

Metode

Penelitian merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang sebanyak 120 orang yang dipilih menggunakan teknik proporsionate stratified random sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat, analisis bivariat dengan uji statistik chi-square dengan derajat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$) dan analisis multivariat dengan uji regresi logistic.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *perceived susceptibility* ($p=0,018$; $POR=2,829$), *perceived barrier* ($p=0,002$; $POR=0,250$), dan *cues to action* ($p=0,036$; $POR=2,520$) memiliki hubungan bermakna dengan tindakan SADARI. Hasil analisis multivariat diperoleh variabel yang paling berhubungan dengan tindakan SADARI adalah *perceived barrier* ($POR=0,257$).

Kesimpulan

Perceived susceptibility, *perceived barrier* dan *cues to action* merupakan faktor yang berhubungan dengan tindakan SADARI. Faktor yang paling berhubungan diantara faktor lainnya adalah *perceived barrier*. Disarankan kepada kampus FKM Universitas Andalas Padang untuk membentuk unit kesehatan mahasiswa sebagai wadah untuk sosialisasi mengenai SADARI kepada mahasiswa lainnya.

Daftar Pustaka : 46 (1995-2019)

Kata Kunci : kanker payudara, SADARI, health belief model, mahasiswa


**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Thesis, April 2020

MUSTIKA RAMADANI ILYAS, BP 1711216025

**FACTORS ASSOCIATED WITH BREAST SELF-EXAMINATION (BSE)
AMONG COLLEGE STUDENTS IN EFFORTS TO EARLY DETECTION OF
BREAST CANCER AT FACULTY OF PUBLIC HEALTH ANDALAS
UNIVERSITY PADANG IN 2020**

viii + 90 pages, 22 tables, 7 images, 8 appendics



ABSTRACT

Objective

Breast self-examination (BSE) has an important role in efforts to early detection of breast cancer, because 95% of breast lumps are found by women themselves. According to Yayasan Kesehatan Kanker Payudara, 80% of Indonesian public do not understand the importance of BSE. The objective of this study is to determine the factors associated with BSE practice among college students at Faculty of Public Health Andalas University Padang in 2020.

Method

This research is a quantitative analytical study using cross sectional approach. Samples in this research are 120 college students at Faculty of Public Health Andalas University Padang chosen with proporsionate stratified random sampling technique. Data were analyzed using univariate, bivariate analysis using chi-square statistical test with confidence level of 95% ($\alpha = 0.05$), and multivariate analysis using logistic regression.

Result

The results showed that level of *perceived susceptibility* ($p=0,018$; $POR=2,829$), *perceived barrier* ($p=0,002$; $POR=0,250$), and *cues to action* ($p=0,036$; $PR=2,520$) have significant correlations with BSE. Multivariate analysis issued that variable with high relation to BSE was *perceived barrier* ($POR=0,257$).

Conclusion

Perceived susceptibility, perceived barrier, and cues to action are factors associated with BSE. The most influencing variable between other factors is *perceived barrier*. It is suggested to Faculty of Public Health Andalas University to establish a college student unit as a forum for socialization BSE to others college student.

References : 46 (1995-2019)

Keywords : breast cancer, BSE, health belief model, college students