

## BAB 7

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

1. Kadar anti-dsDNA pada penderita Lupus Eritematosus Sistemik di Poliklinik Penyakit Dalam Sub-spesialis Reumatologi RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagian besar ditemukan pada tingkat kadar yang negatif (<100 IU/mL).
2. Aktivitas penyakit pada penderita Lupus Eritematosus Sistemik di Poliklinik Penyakit Dalam Sub-spesialis Reumatologi RSUP Dr. M. Djamil Padang yang diukur dengan metode MEX-SLEDAI sebagian besar ditemukan pada fase remisi dan aktivitas penyakit berat dan sangat berat tidak ditemukan pada sampel penelitian ini.
3. Terdapat korelasi signifikan dalam derajat sedang antara kadar anti-dsDNA dengan aktivitas penyakit pada penderita Lupus Eritematosus Sistemik di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

#### 7.2 Saran

1. Pemeriksaan kadar anti-dsDNA penting dilakukan pada penderita Lupus Eritematosus Sistemik untuk menunjang penilaian aktivitas penyakit.
2. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menilai kadar anti-dsDNA dan aktivitas penyakit sebelum dan sesudah pengobatan pada penderita Lupus Eritematosus Sistemik dengan melakukan uji klinis.