

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh pemberian antibiotik seftriakson dalam mencegah infeksi pasca operasi.
2. Terdapat pengaruh pemberian antibiotik sefazolin dalam mencegah infeksi pasca operasi.
3. Terdapat pengaruh pemberian antibiotik seftriakson sebelum dan setelah operasi dalam mencegah infeksi pasca operasi.
4. Tidak terdapat perbedaan pengaruh dari pemberian antibiotik profilaksis sefazolin dan seftriakson serta antibiotik seftriakson sebelum dan setelah operasi dalam mencegah infeksi pasca operasi.

7.2. Saran

1. Disarankan untuk menggunakan antibiotik sefazolin 2 gr 30 menit sebelum operasi sebagai antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi luka operasi. Selain untuk mencegah terjadinya resistensi, hal ini juga sejalan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh ACOG, POGI dan PPRA RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam pemberian antibiotik profilaksis untuk pasien obstetri dan ginekologi.
2. Dilakukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan jenis kasus yang lebih bervariasi untuk lebih menguatkan penelitian ini.