

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tentang hubungan ANC terhadap kejadian *stunting* pada balita 0-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kejadian *stunting* pada balita usia 0-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang yaitu 13,9%.
2. Distribusi frekuensi antenatal care dengan kunjungan tidak lengkap 60,8% dan kualitas tidak baik 75,9% di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang .
3. Tidak terdapat hubungan bermakna antara ANC dengan kejadian *stunting* pada anak usia 0-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang.

7.2 Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan pengalaman dan pengamatan peneliti sebagai berikut :

1. Petugas kesehatan perlu untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya ANC selama kehamilan.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas ANC yang diberikan oleh pihak puskesmas kepada ibu hamil sesuai standar pelayanan minimal yaitu melakukan 7T selama kehamilan.
3. Petugas kesehatan lebih mengoptimalkan penyuluhan mengenai pentingnya asupan gizi kepada calon Ibu agar terhindar dari anak dengan status gizi *stunting*.
4. Pendataan dari pihak puskesmas harus lebih detail dan diperbaiki setiap bulannya agar data yang didapatkan valid.
5. Perlu dilakukan penelitian terkait dengan temuan ANC yang tidak lengkap dan tidak baik di puskesmas Seberang Padang.