

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Pada penelitian ini didapatkan injeksi intravitreal anti-VEGF diberikan pada pasien retinopati diabetik dengan NPDR sedang dan berat dengan DME, serta PDR.
2. Terdapat perubahan tajam penglihatan pada pasien retinopati diabetik setelah diberikan injeksi intravitreal anti – VEGF. Didapatkan hampir sebagian besar pasien mengalami perbaikan tajam penglihatan, dimana 48% diantaranya mengalami perbaikan kategori tajam penglihatan, sedangkan yang lainnya tetap berada pada kategori yang sama.

1.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilaksanakan di multicenter dengan *range* tahun yang lebih panjang, sehingga diharapkan dapat menggambarkan masyarakat luas.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi derajat keparahan retinopati diabetik dan mempengaruhi tajam penglihatan setelah dilakukan tindakan injeksi intravitreal anti-VEGF.
3. Peneliti menyarankan agar dokter lebih meningkatkan edukasi terhadap pasien dan keluarga terkait pentingnya melakukan *follow up* secara berkala sesuai dengan anjuran dokter, agar tajam penglihatan pasien lebih terkontrol dan dapat terpantau perbaikan maupun perburukannya.