

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa :

1. Kejadian *Drug Related Problems* pada pasien stroke iskemik di bangsal saraf RSUP Dr. M. Djamil Padang terbanyak pada indikasi yang tidak diterapi sebesar 60,98 %, di ikuti pemilihan obat yang tidak tepat sebesar 17,07 %, obat tanpa indikasi sebesar 14,63 %, interaksi obat sebesar 7,32 % dan kegagalan memperoleh obat sebesar 0 %.
2. Terdapat hubungan *Drug Related Problems* dengan *Clinical Outcomes* pasien di mana adanya hubungan kategori *DRPs* yaitu dengan pemilihan obat yang tidak tepat dan adanya interaksi obat dapat meningkatkan tekanan darah sistole. Serta adanya pemberian obat tanpa indikasi pada pasien dapat menurunkan score *Glasgow Coma Scale* pasien. Sehingga dengan semakin banyaknya *DRPs* tersebut dapat menyebabkan outcome pasien yang kurang baik. Tetapi untuk kategori *DRPs* yang lain yakni indikasi yang tidak diterapi tidak ada hubungan dengan *Clinical Outcomes* pasien.

B. Saran

1. Farmasis di rumah sakit diharapkan dapat menjalankan farmasi klinis secara optimal agar dapat mengurangi / menghindari terjadinya *Drug Related Problems* di rumah sakit khususnya di bangsal rawat inap.
2. Petugas medis diharapkan melakukan pencatatan yang jelas dan lengkap pada rekam medik pasien.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih fokus pada salah satu *Drug Related Problems* saja, sehingga dapat lebih jelas dan mendalami mengenai kejadian *Drug Related Problems* tersebut dari sebab dan akibatnya pada outcome pasien.