

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Rerata Rasio Netrofil Limfosit pada pasien PGK stadium V Pre-HD adalah $9,45 \pm 5,65$ dimana terdapat peningkatan yang bermakna dibanding nilai normal.
2. Rerata kadar IL-17 serum pada pasien PGK stadium V adalah $840,49 \pm 1446,70$ pg/ml di mana terdapat peningkatan yang bermakna dibanding nilai normal.
3. Rerata Rasio Netrofil Limfosit pada pasien PGK stadium V Post-HD adalah $5,47 \pm 3,53$ dimana terdapat peningkatan yang bermakna dibanding nilai normal. Tetapi lebih rendah dibandingkan RNL Pre-HD
4. Rerata kadar IL-17 pada pasien PGK stadium V Post-HD adalah $310,68 \pm 460,75$ pg/ml di mana terdapat peningkatan yang bermakna dibanding nilai normal. Tetapi lebih rendah dibandingkan PGK Pre-HD.
5. Terdapat pengaruh hemodialisis terhadap Rasio Netrofil Limfosit antara kelompok Pre-HD dan Post-HD, dimana terdapat penurunan RNL yang signifikan dan lebih baik pada kelompok Post-HD.
6. Terdapat pengaruh hemodialisis terhadap IL-17 serum antara kelompok Pre-HD dan Post-HD, dimana terdapat penurunan kadar IL-17 yang signifikan dan lebih baik pada kelompok Post-HD.

7.2 Saran

1. Perlunya dipertimbangkan dilakukan pemeriksaan Rasio Netrofil Limfosit pada pasien PGK.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang ikut berperan dalam terjadinya inflamasi kronik pada pasien PGK.

