

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Rerata jumlah koloni *Lactobacillus* pada kelompok normal yaitu $17.209.120,00 \pm 76.215.391,408$ CFU/ml, sedangkan pada pasien *Overactive Bladder* di Poli Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Pauh Kota Padang yaitu $15.991.113,00 \pm 69.216.342,908$ CFU/ml.
2. Tidak terdapat hubungan antara koloni *Lactobacillus* dengan kejadian *Overactive bladder* (OAB) pada pasien OAB di Poli Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Pauh Kota Padang.

7.2 Saran

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab penurunan jumlah Koloni *Lactobacillus* pada pasien *overactive bladder* serta keberadaan mikroorganisme lainnya terutama mikroorganisme patogen.
2. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai hubungan koloni *Lactobacillus* dengan kejadian *overactive bladder* dengan memasukkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *overactive bladder* sebagai variabel yang diteliti.
3. Dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar.