

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perubahan ukuran tumor sebelum dan sesudah pemberian kemoterapi neoadjuvant, yaitu ukuran tumor semakin kecil setelah pemberian kemoterapi neoadjuvant
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan perubahan ukuran tumor ($p < 0,05$), yaitu semakin tinggi usia semakin kecil perubahan ukuran tumor
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar hemoglobin dan perubahan ukuran tumor ($p > 0,05$)
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh dengan perubahan ukuran tumor ($p > 0,05$)

7.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel berbeda dari variabel yang telah diteliti sebelumnya seperti derajat diferensiasi dan tipe histopatologi tumor, hemoglobin rerata pasien saat menjalankan kemoterapi, serta melakukan tambahan analisis data dengan analisis multivariat.
2. Pelayanan kesehatan pada pasien kanker serviks selalu mempertimbangkan kondisi-kondisi klinis pasien setiap akan melakukan kemoterapi neoadjuvant untuk mendapatkan respon kemoterapi yang baik