

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Hubungan Jumlah Eosinofil Ukuran Polip, Usia dan Jenis Kelamin Penderita Polip Nasal di Sentra Diagnostik Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2017- 2019” maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah eosinofil dengan ukuran polip nasal di Sentra Diagnostik Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2017- 2019.
2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah eosinofil dengan usia penderita polip nasal di Sentra Diagnostik Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2017- 2019.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah eosinofil dengan jenis kelamin penderita polip nasal di Sentra Diagnostik Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2017- 2019.

#### **7.2. Saran**

1. Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan dengan menggunakan subjek peneliti yang lebih banyak serta dilakukan pada lebih dari satu sentra diagnostik sehingga bisa mewakili tiap- tiap variabel dan meningkatkan akurasi hasil penelitian.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menganalisa gambaran faktor yang mempengaruhi kejadian polip nasal.
3. Diharapkan penelitian ini menggunakan data klinis dari Rumah Sakit untuk melengkapi data Patologi Anatomi sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.
4. Pada penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel seperti tipe histopatologi, pengaruh tindakan op, maupun yang lainnya, karena

kemungkinan masih banyak faktor yang bisa mempengaruhi kejadian polip nasal.

