

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

1. Sebagian besar nilai IAP pada pasien stroke iskemik akut adalah risiko tinggi.
2. Jenis kelamin terbanyak pasien stroke iskemik akut dan pasien dengan IAP risiko tinggi adalah laki-laki.
3. Kelompok umur terbanyak pasien stroke iskemik akut dan pasien dengan IAP risiko tinggi adalah di atas 50 tahun.
4. Faktor risiko terbanyak pasien stroke iskemik akut dan pada pasien dengan IAP risiko tinggi adalah hipertensi, diikuti oleh dislipidemia, merokok, obesitas, asam urat, dan diabetes mellitus.
5. Terdapat hubungan antara dislipidemia sebagai faktor risiko dengan derajat IAP.

#### 6.2 Saran

1. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengikutsertakan faktor-faktor lain yang memengaruhi IAP seperti aktivitas fisik, riwayat keluarga, dan faktor lingkungan pada pasien stroke iskemik akut.
2. Masyarakat dengan faktor risiko diharapkan dapat menatalaksana faktor risiko yang dapat dimodifikasi tersebut untuk mencegah kejadian stroke iskemik akut.
3. Sebaiknya pemeriksaan profil lipid rutin dilakukan pada pasien stroke iskemik akut dan dicatat di dalam data rekam medis.