

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Adanya interaksi antara pupuk kandang ayam terhadap mulsa pada jumlah umbi per rumpun dengan interaksi terbaik pada mulsa plastik hitam perak dan pupuk kandang ayam dosis 50 ton/ha.
2. Mulsa plastik hitam perak memberikan pengaruh yang terbaik terhadap bobot segar umbi per rumpun, bobot kering umbi per rumpun, bobot segar umbi per petak dan per hektar, dan bobot kering angin umbi per petak dan per hektar.
3. Pupuk kandang ayam dosis 40 ton/ha memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (*Allium ascalonicum* L.).

B. Saran

Untuk mendapatkan hasil tanaman bawang merah yang baik disarankan untuk menggunakan mulsa plastik hitam perak dan pupuk kandang ayam dosis 40 ton/ha. Pemilihan varietas yang digunakan sebagai bibit untuk budidaya tanaman bawang merah penting untuk diperhatikan. Selain itu, sebaiknya budidaya bawang merah tidak dilakukan pada musim penghujan terutama pada daerah yang curah hujannya tinggi.

