


SKRIPSI

**GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN PERAWAT YANG
MEMPUNYAI LANSIA DI MASA PENDEMI COVID-19
DI RSUP Dr. M.DJAMIL PADANG TAHUN 2020**

Penelitian Keperawatan Gerontik



**RAHMA YENI
BP: 1911319025**

**Pembimbing 1 : Gusti Sumarsih. S Kp, M. Biomed
Pembimbing 2 : Ns. Hendra Harwadi, M.Kep**

**PROGRAM STUDI SI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2021**

PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

JANUARI 2021

Nama : Rahma Yeni

No.BP : 1911319025

**Gambaran Tingkat Kecemasan Perawat Yang Mempunyai Lansia di Masa
Pandemi Covid-19 di RSUP. Dr. M. Djamil Padang Tahun 2020**

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah menjadi krisis kesehatan di dunia karena penyebaran sangat cepat, hal ini dapat menimbulkan kecemasan padaperawat, karena penyakit ini sangat berisiko terhadap kelompok rentan terutama mereka yang mempunyai lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecemasan perawat yang mempunyai lansia dimasa pandemi Covid-19 di RSUP Dr. M. Damil Padang (IGD, IRJ dan Irna Paviliun Ambun Pagi). Penelitian ini menggunakan desain deskriptif cross-sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 75 orang dengan pengambilan sampel dengan tehnik total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner HRS-A 14 (Hamilton Rating Scale for Anxiety) melalui google form. Hasil penelitian menunjukkan di IGD perawat yang mempunyai lansia mengalami 85,2% kecemasan ringan, 14,8% kecemasan sedang, yang mempunyai lansia dengan komorbid 63% dan yang tidak ada komorbid 37%. Di IRJ perawat yang mempunyai lansia mengalami kecemasan ringan 61,3% dan mengalami kecemasan sedang 38,7%, perawat yang mempunyai lansia dengan komorbid 80,6% dan yang tidak mempunyai komorbid 19,4%. Di Irna Paviliun Ambun Pagi perawat yang mempunyai lansia yang tidak mengalami kecemasan sebanyak 41,2%, mengalami kecemasan ringan 47,1% dan mengalami kecemasan sedang 11,8%, perawat yang mempunyai lansia dengan komorbid sebanyak 52,9% dan yang tidak ada komorbidnya sebanyak 47,1%. Untuk mengelola tingkat kecemasan pada perawat yang mempunyai lansia di masa Pandemi Covid-19 diharapkan pada perawat untuk selalu berfikiran positif, mengubah pola pikir, perilaku, dan selalu membuka diri untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang bisa diakses melalui media cetak maupun elektronik dan internet serta memulai aktivitas fisik yang menyenangkan. Dan di harapkan pada instansi untuk memantau masalah kesehatan mental perawat terkait adanya perasaan cemas selama masa Pandemi Covid-19.

Kata kunci: kecemasan, Covid-19, perawat, lansia.

PROGRAM STUDY OF NURSING SCIENCE

NURSING FACULTY

ANDALAS UNIVERSITY

JANUARI, 2021

Name : Rahma Yeni

Registered Number : 1911319025

Description of the Anxiety Level of Nurses Who Have the Elderly during the Covid-19 Pandemic at RSUP. Dr. M. Djamil Padang in 2020

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has become a health crisis in the world because it spreads very quickly, this can cause anxiety for nurses, because this disease is very risky for vulnerable groups, especially those who have the elderly. This study aims to determine the level of anxiety of nurses who have elderly people during the Covid-19 pandemic at Dr. M. Damil Padang (IGD, IRJ and Irna Pavilion Ambun Pagi). This study used a cross-sectional descriptive design. The number of samples in this study were 75 people with a total sampling technique. Data collection was carried out with the HRS-A 14 questionnaire (Hamilton Rating Scale for Anxiety) via google form. The results showed that in the emergency room nurses who had elderly experienced 85.2% mild anxiety, 14.8% moderate anxiety, those who had elderly with comorbids 63% and those without comorbids 37%. In IRJ, nurses who had elderly experienced mild anxiety 61.3% and moderate anxiety 38.7%, nurses who had elderly with a comorbidity of 80.6% and who did not have comorbid 19.4%. In Irna Pavilion Ambun Pagi nurses who have elderly who are not present experience anxiety as much as 41.2%, experience mild anxiety 47.1% and experience moderate anxiety 11.8%, nurses who have elderly with a comorbid are 52.9% and those who 47.1% of the elderly had no comorbid. To manage the level of anxiety among nurses who have elderly people during the Covid-19 Pandemic, it is hoped that nurses will always think positively, change their mindset, behavior, and always open themselves up to add insight and knowledge that can be accessed through print and electronic media and the internet and start enjoyable physical activity. And it is hoped that the agency will monitor mental health problems for nurses related to feelings of anxiety during the Covid-19 Pandemic.

Key words: anxiety, Covid-19, nurses, elderly.

