

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan pada bab VI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan minum obat pasien PJK di RSUP dr. M.Djamil Padang ditemukan kurang dari separuh pasien PJK masih tergolong kategori tidak patuh dalam mengkonsumsi obat.
2. Pengetahuan pasien PJK di RSUP. dr. M.Djamil Padang ditemukan hampir sebahagian besar pasien PJK sudah memiliki pengetahuan dengan kategori baik.
3. Sikap pasien PJK di RSUP. dr. M.Djamil Padang ditemukan hampir semua pasien PJK sudah memiliki sikap dengan kategori positif.
4. Dukungan keluarga dari pasien PJK di RSUP. dr. M.Djamil Padang ditemukan kurang dari separuh pasien PJK mendapatkan dukungan yang tinggi dari keluarga dalam kepatuhan minum obat.
5. Ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien PJK .  
( *p value* (0,039) < 0,05)
6. Ada hubungan sikap dengan kepatuhan minum obat pada pasien PJK.  
( *p value* (0,012) < 0,05)



7. Ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien PJK. (*p value* (0,010) < 0,05)

## **B. Saran**

### **1. Bagi Rumah Sakit**

2. Hasil penelitian ini masih didapatkan pasien PJK dengan tingkat pengetahuan yang baik namun masih tidak patuh minum obat. Berdasarkan hal tersebut diharapkan menjadi bahan masukan bagi rumah sakit khususnya pemegang kebijakan promosi kesehatan dalam mengevaluasi program ataupun kebijakan promosi kesehatan terkait edukasi tentang pentingnya kepatuhan minum obat PJK itu sendiri guna meningkatkan kepatuhan minum obat pasien PJK.

### **3. Bagi Pelayanan Keperawatan**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelayanan keperawatan pada pasien PJK terutama menjadikan aspek pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga sebagai poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam asuhan keperawatan untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pasien PJK.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penelitian selanjutnya untuk melihat faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat pasien PJK. Walaupun hasil penelitian ditemukan banyak pasien dengan pengetahuan baik dan sikap positif, namun masih tidak patuh dalam terapi obat. Hal ini perlu kajian selanjutnya yang

dengan pengembangan desain penelitian seperti eksperimen berupa perubahan perilaku kepatuhan minum obat sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan .

