

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

1. Terdapat perbedaan skor mukositis sebelum dan sesudah diberikannya intervensi *chewing gum* pada anak kanker yang menjalani kemoterapi. Rerata nilai median sebelum diberikan intervensi adalah $11 \pm 2,00$ dan rerata nilai median sesudah diberikan intervensi adalah $4 \pm 1,03$ dengan nilai selisih median yaitu 7.
2. Terdapat pengaruh pemberian *chewing gum* terhadap mukositis pada anak kanker yang menjalani kemoterapi dengan nilai $p=0,001$ ($p<0,05$).

B. Saran

1. Bagi Pelayanan Keperawatan

Perawat anak dapat melakukan intervensi ini pada anak kanker yang menjalani kemoterapi. Selain itu keluarga sebaiknya dilibatkan selama pemberian intervensi.

2. Bagi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan rujukan terkait *evidence based practice* terkait pengobatan mukositis pada anak kanker yang menjalani kemoterapi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya perlu mengembangkan intervensi lain yang bisa digunakan untuk penatalaksanaan mukositis disertai adanya kelompok pembanding dan mengembangkannya dengan metode penelitian yang berbeda seperti penelitian kualitatif.

