

BAB 7

PENUTUP

7.1 Simpulan

Setelah dilakukan peneliti tentang hubungan dukungan keluarga dengan komunikasi terapeutik dengan kecemasan anak menjalani kemoterapi di Ruang Anak RSUP DR M. Djamil Padang Tahun 2021 yang dilakukan pada 42 orang sampel diketahui:

1. Lebih dari separuh responden (66,7%) anak mengalami kecemasan di atas rata-rata (28,29).
2. Lebih dari separuh responden (54,8%) dukungan keluarga kurang di atas rata-rata (31,52).
3. Lebih dari separuh responden (52,4%) komunikasi terapeutik perawat kurang di atas rata-rata (29,57).
4. Terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan anak menjalani kemoterapi di ruang anak RSUP DR M. Djamil Padang dengan nilai P Value = 0,037.
5. Terdapat hubungan komunikasi terapeutik dengan kecemasan anak menjalani kemoterapi di ruang anak RSUP DR M. Djamil Padang dengan nilai P Value = 0,012.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Bagi RSUP Dr. M. Djamil Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan asuhan keperawatan pada anak yang mengikuti kemoterapi dan sebagai bahan pertimbangan bagi perawat dalam melakukan komunikasi terapeutik. Mengarahkan kepada keluarga untuk memberikan dukungan keluarga guna meningkatkan pelayanan dalam mengurangi kecemasan anak yang menjalani kemoterapi di bangsal anak RSUP Dr. M. Djamil Padang. Dari hasil penelitian ini diperlukannya pengadaan ruangan terapi bermain anak untuk pasien khususnya pasien kemoterapi. Sebaiknya Terapi bermain diberikan sebelum di berikan kemoterapi dirumah sakit agar kecemasan anak berkurang

2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menanbah perbendarahaan bacaan bagi mahasiswa/mahasiswi Universitas Andalas untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti dukungan keluarga, komunikasi terapeutik perawat dan kecemasan pasien menjalani kemoterapi dan menambah tindakan cara menangani kecemasan pasien menjalani kemoterapi dan meningkatkan dukungan keluarga dan komunikasi terapeutik perawat serta menambahkan terapi bermain anak.