

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Tidak terjadi kompetisi antara predator *P. pseudoannulata* dan *O. nigrofasciata*. Sebaliknya, gabungan *P. pseudoannulata* dan *O. nigrofasciata* mampu meningkatkan daya predasi terhadap WBC dibandingkan ketika kedua predator tersebut sendirian. Daya predasi *P. pseudoannulata* dan *O. nigrofasciata* sebanyak 9,4, 18,6 dan 28,4 ekor WBC, sedangkan ketika kedua predator tersebut sendirian, daya predasi *P. pseudoannulata* sebanyak 7,6, 15,8 dan 21,8 ekor WBC dan *O. nigrofasciata* hanya sebanyak 3,4, 6,6 dan 9,4 ekor WBC pada kepadatan 10, 20, dan 30 ekor nimfa WBC instar 2-3. Perbedaan kepadatan WBC tidak mempengaruhi berat tubuh *P. pseudoannulata* dan *O. nigrofasciata*.

### B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui perkembangan daya predasi *P. pseudoannulata* dan *O. nigrofasciata* dengan menambahkan jumlah mangsa setiap hari pengujian.

