

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dugaan kejadian efek samping obat yang terjadi pada pasien gagal jantung di RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran karakteristik pasien terbanyak yaitu berjenis kelamin laki-laki (60,8%), kelompok berusia dewasa (60,8%), pendidikan terbanyak yaitu jenjang pendidikan lanjutan (73,9%), dan sebagian besar pasien yang bekerja (69,6%). Berdasarkan karakteristik klinis pasien gagal jantung dengan jumlah terbanyak yaitu pasien dengan penyakit penyerta (95,6%), jumlah penggunaan ≥ 5 obat (100%) dan jumlah pada kategori lama rawatan ≥ 6 hari (52,2%) di rumah sakit.
2. Dugaan efek samping obat terjadi pada pasien gagal jantung sebanyak 25 pasien (%). Secara analisa statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan kejadian dugaan efek samping obat gagal jantung berdasarkan karakteristik demografi dan klinis pasien di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2019.

5.2 Saran

1. Sebaiknya penelitian ini dilanjutkan dengan metode prospektif supaya hasil lebih akurat karena kontak dengan pasien langsung.
2. Perlu adanya kolaborasi antara dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan lainnya dalam menentukan efek samping obat.
3. Adapun seluruh hasil pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran profil dan terapi pasien gagal jantung di RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk digunakan sebagai referensi tambahan pada pengobatan pasien gagal jantung.