

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang kajian efek samping obat pada pasien jantung koroner dengan populasi 200 orang yang dirawat di Instalasi Rawat Inap Penyakit Jantung RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2017-2019 dengan 83 orang memenuhi kriteria inklusi, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan obat pada pasien jantung koroner terbanyak adalah kombinasi 3 obat (49,5%) dengan obat yang digunakan yaitu Atorvastatin-Clopidogrel-Aspirin.
2. Dugaan efek samping obat terjadi pada 24 pasien dengan karakteristik terbanyak yaitu jenis kelamin laki-laki (54,2%), umur lansia (75%), pendidikan lanjut (58,3%), lama rawatan >seminggu (54,2%), keadaan pulang perbaikan (95,8%), ada penyakit penyerta (100%), penggunaan obat secara umum  $\geq 5$  (100%), dan penggunaan obat jantung koroner secara kombinasi (87,5%).
3. Secara statistik ditemukan adanya perbedaan kejadian efek samping obat berdasarkan kelompok umur dengan nilai  $p = 0,029$  ( $p < 0,05$ ).

#### 5.2 Saran

1. Diupayakan agar semua pendekatan kejadian efek samping obat dapat terpenuhi sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih valid.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan metode prospektif agar dapat mengamati kondisi pasien secara langsung.