

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Rerata Kadar Albumin Serum sebelum pemberian perlakuan pada kelompok Ekstrak Ikan Gabus adalah $2,72 \pm 0,15$ gr/dl, sedangkan pada kelompok Albumin oral metode freeze dryer adalah $2,66 \pm 0,17$ gr/dl.
2. Rerata Kadar Albumin Serum sebelum pemberian perlakuan pada kelompok Ekstrak Ikan Gabus adalah $2,72 \pm 0,15$ gr/dl, sedangkan pada kelompok Albumin oral metode freeze dryer adalah $2,66 \pm 0,17$ gr/dl.
3. Albumin oral metode freeze dryer sachet menghasilkan peningkatan kadar albumin yang lebih tinggi dari pada ekstrak ikan gabus cair

7.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan :

1. Perlu penetapan protap pemberian asupan albumin oral pada penderita preeklampsia dengan hipoalbuminemia.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan menilai kadar albumin serum selama proses kehamilan dan menilai faktor – faktor penyebab rendahnya kadar albumin pada kehamilan

