

**PERBEDAAN TINGKAT ANSIETAS DAN DUKUNGAN KELUARGA  
PASIEN KANKER SERVIKS DENGAN PASIEN KANKER OVARIUM  
STADIUM LANJUT DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG  
TAHUN 2020**



Skripsi  
Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai  
Pemenuh Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh  
NADYA CAHYU NINGSIH  
NIM : 1710311066

- Pembimbing :
1. Dr. dr. Hudila Rifa Karmia, Sp. OG
  2. Dr. dr. Hj. Yaslinda Yaunin, Sp. KJ

**FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2021**

## ABSTRACT

### **The Difference of Anxiety Level and Family Support between Advanced Cervical Cancer Patients and Advanced Ovarian Cancer Patients at RSUP Dr. M. Djamil Padang in 2020**

By

**Nadya Cahyu Ningsih**

Cervical cancer is a malignancy that happens in the cervix, while ovarian cancer is a cancer that grows in the ovarian. Anxiety is found in many advanced cancer patients. Anxiety can give some negative effects. This condition gives a big pressure so that the patient needs support from their family. The purpose of this study is to determine the differences in anxiety level and family support of advanced cervical cancer patients with advanced ovarian cancer patients at the Obstetrics and Gynecology Polyclinic of RSUP Dr. M. Djamil Padang.

The design of this study was a cross-sectional study and the sample consisted of 47 patients with advanced cervical cancer and 47 patients with advanced ovarian cancer that is obtained by using the quota sampling technique and analyzed by using the chi-square test. The research sample was collected in July – November 2020 at the Obstetrics and Gynecology Polyclinic of RSUP Dr. M. Djamil Padang.

The results showed that patients that experienced anxiety were more common in advanced cervical cancer patients which were 32 patients (68.1%) compared to advanced ovarian cancer patients that were 23 patients (48.9%). Patients with high family support occurred more often in advanced ovarian cancer patients that were 44 patients (93.6%) compared to patients with advanced cervical cancer that were 35 patients (74.5%). The statistic results by using the chi-square test were that there was no significant difference in anxiety level ( $p=0.094$ ) and there was a significant difference in family support ( $p=0.024$ ) between advanced cervical cancer patients and advanced ovarian cancer patients.

The conclusions of this study are that there is no significant difference in anxiety level and there is a significant difference in family support between advanced cervical cancer patients and advanced ovarian cancer patients at the Obstetrics and Gynecology Polyclinic of RSUP Dr. M. Djamil Padang.

**Keywords** : Advanced cervical cancer, advanced ovarian cancer, anxiety, family support

## ABSTRAK

### Perbedaan Tingkat Ansietas dan Dukungan Keluarga Pasien Kanker Serviks dengan Pasien Kanker Ovarium Stadium Lanjut di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2020

Oleh

Nadya Cahyu Ningsih

Kanker serviks merupakan keganasan yang terdapat pada serviks, sedangkan kanker ovarium merupakan kanker yang tumbuh di ovarium. Ansietas banyak ditemukan pada pasien kanker stadium lanjut. Ansietas dapat memberikan efek negatif. Kondisi tersebut memberikan pukulan yang besar sehingga membutuhkan dukungan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat ansietas dan dukungan keluarga pasien kanker serviks dengan pasien kanker ovarium stadium lanjut di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Desain penelitian ini berupa *cross sectional* dan sampel penelitian berjumlah 47 pasien kanker serviks stadium lanjut dan 47 pasien kanker ovarium stadium lanjut dengan teknik *kuota sampling* dan dianalisis dengan menggunakan uji *chi-square*. Pengumpulan sampel penelitian dilaksanakan pada bulan Juli - November 2020 di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Hasil penelitian didapatkan pasien yang mengalami ansietas lebih banyak terjadi pada pasien kanker serviks stadium lanjut yaitu 32 pasien (68,1%) dibandingkan pasien kanker ovarium stadium lanjut yaitu 23 pasien (48,9%). Pasien dengan dukungan keluarga tinggi lebih banyak terjadi pada pasien kanker ovarium stadium lanjut yaitu 44 pasien (93,6%) dibandingkan dengan pasien kanker serviks stadium lanjut yaitu 35 pasien (74,5%). Hasil penelitian secara statistik dengan uji *chi-square* adalah tidak terdapat perbedaan tingkat ansietas yang signifikan ( $p=0,094$ ) dan terdapat perbedaan dukungan keluarga yang signifikan ( $p=0,024$ ) antara pasien kanker serviks dengan pasien kanker ovarium stadium lanjut.

Kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan tingkat ansietas yang signifikan dan terdapat perbedaan dukungan keluarga yang signifikan antara pasien kanker serviks dengan pasien kanker ovarium stadium lanjut di Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. M. Djamil Padang.

**Kata Kunci :** Kanker serviks stadium lanjut, kanker ovarium stadium lanjut, ansietas, dukungan keluarga