

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

1. Karakteristik umum penderita hernia yang menjalani herniorafi dengan prosedur TEP dan TAPP dalam penelitian ini adalah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, usia rata-rata pasien adalah 59,1 tahun, dengan persentase yang mengalami nyeri kronis sebesar 3,71% pada prosedur TEP dan 7,41% pada prosedur TAPP.
2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kejadian nyeri kronis pasca operasi pada pasien yang menjalani laparaskopi herniorafi dengan prosedur TEP maupun TAPP.

#### 7.2 Saran

1. Diharapkan dibuat penelitian lanjutan dengan variabel perbandingan yang lebih banyak, yaitu faktor risiko lain yang berhubungan dengan nyeri kronis pasca operasi pasien yang menjalani laparaskopi herniorafi dengan prosedur TEP dan TAP, seperti cedera nervus, jenis analgetik dan anestesi, nyeri pre operasi, dan nyeri segera pasca operasi.
2. Diharapkan dibuat penelitian lanjutan dengan menggunakan parameter yang lebih detail untuk menilai kualitas hidup penderita hernia yang menjalani herniorafi dengan prosedur TEP dan TAPP agar dapat meninjau berapa besar pengaruh nyeri kronis terhadap berbagai aspek kehidupan pasien.