

**GAMBARAN FUNGSI KOGNITIF PADA PASIEN KEGANASAN
PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RSUP. DR. M.**

DJAMIL PADANG



1. dr. Restu Susanti, Sp. S, M. Biomed
2. dr. Selfi Renita Rusjdi, M. Biomed

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

ABSTRACT

COGNITIVE FUNCTION IN BREAST MALIGNANT PATIENTS THROUGH CHEMOTHERAPY IN RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG

By
Zakiya Ifana Putri

Introduction : Chemotherapy is a therapy on patients with breast malignancies can causes impaired cognitive function. Cognitive impairment founded in 75% patients with breast malignancies in chemotherapy used. This study aim the description of cognitive function in breast cancer patients undergoing chemotherapy at Dr. M. Djamil Padang.

Methods : This study was a descriptive study with a cross sectional study design and used simple random sampling. Total sample is 44 patients. This research was conducted on March 2020-January 2021.

Results : This study shows that 75% of subjects had cognitive impairment. Cognitive disorders mostly found in middle age and at primary and junior secondary education levels, namely 100%. It found since the second chemotherapy and mostly found in 5-Flourouracil-Doxorubicin-Cyclophosphamide used.

Conclusion : Cognitive disorders mostly found in middle age and low education levels as well as in the third and fourth chemotherapy. Most cognitive impairment was found in 5-Flourouracil-Doxorubicin-Cyclophosphamide combination therapy used.

Key words : breast malignancy, chemotherapy, cognitive impairment

ABSTRAK

GAMBARAN FUNGSI KOGNITIF PADA PASIEN KEGANASAN PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG

Oleh
Zakiya Ifana Putri

Pendahuluan: Kemoterapi pada pasien keganasan payudara dapat menyebabkan gangguan kognitif. Gangguan kognitif ditemukan pada 75% pasien dengan keganasan payudara yang sedang menjalani kemoterapi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran fungsi kognitif pada penderita keganasan payudara yang menjalani kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain *cross sectional*. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling* sebanyak 44 orang. Penelitian ini berlangsung dari Maret 2020-Januari 2021.

Hasil: Sebanyak 75% subjek penelitian mengalami gangguan kognitif. Gangguan kognitif paling banyak ditemukan pada kelompok usia pertengahan dan pada tingkat pendidikan rendah yaitu 100%. Gangguan kognitif paling banyak ditemukan pada penggunaan obat kombinasi CAF.

Kesimpulan: Subjek penelitian terbanyak mengalami gangguan kognitif paling banyak ditemukan pada usia pertengahan dan tingkat pendidikan rendah serta pada kemoterapi ketiga dan keempat. Gangguan kognitif terbanyak ditemukan pada pemberian terapi kombinasi *5-Flourouracil-Doxorubicin-Cyclophosphamide*.

Kata kunci: Keganasan payudara, kemoterapi, gangguan kognitif