

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran fungsi kognitif pada pasien keganasan payudara di RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat usia subjek penelitian terbanyak adalah pada usia dewasa akhir, tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA/ sederajat, jumlah kemoterapi yang paling banyak dijalani adalah kemoterapi keempat, dan jenis kemoterapi yang lebih banyak digunakan adalah terapi kombinasi.
2. Sebanyak 75% pasien keganasan payudara yang menjalani kemoterapi di RSUP Dr. M. Djamil padang mengalami gangguan kognitif.
3. Subjek penelitian dengan gangguan kognitif paling banyak ditemukan pada usia pertengahan, tingkat pendidikan SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat, sedang menjalani kemoterapi ketiga dan keempat, dan pada penggunaan obat kombinasi *5-flourouracil-doxorubicin-cyclophosphamide*.

#### **6.2 Saran**

1. Perlu penelusuran lebih lanjut mengenai faktor penyebab terjadinya gangguan kognitif pada pasien yang menjalani kemoterapi.
2. Penelitian mengenai gambaran fungsi kognitif pada pasien keganasan yang menjalani kemoterapi perlu dilakukan pada jenis keganasan lainnya.
3. Penelitian mengenai gambaran fungsi kognitif dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner gangguan kognitif lainnya
4. Jumlah sampel perlu ditingkatkan agar didapatkan lebih banyak variasi sampel.
5. Perlu diketahui derajat fungsi kognitif subjek penelitian sebelum dilakukan kemoterapi.