## V. KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Populasi *S. sumatranus* di Sumatera Barat ditemukan pada dua lokasi, gunung Singgalang dan gunung Marapi, dengan habitatnya pada daerah cadas, hutan lumut, dan puncak gunung. Populasi *S. sumatranus* yang ditemukan hidup secara soliter atau berkoloni.
- 2. Variasi morfologi *S. sumatranus* yang ditemukan pada tiga populasi yang diamati sebanyak 11 karakter, dengan karakter yang menjadi kunci dalampemisahan 2 (dua) klaster (populasi cadas dan populasi non cadas) sebanyak 6 karakter, yaitu bentuk umum daun bawah (BDP), bentuk umum daun atas (BD), bentuk pangkal daun atas (BPD), panjang braktea (PB), rasio ligula (RL), dan bentuk umum ligula (BL).
- 3. Berdasarkan perbandingan rasio log polen-ovul sistem perkawinan populasi *S. sumatranus* di Sumatera Barat adalah mendekati *Xenogami*.

BANGS

## 5.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut terkait jenis ini agar menambah informasi dan data untuk membantu dalam status konservasi jenis baik secara nasional maupun internasional.