

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran stadium POAG pada pasien POAG di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada stadium ringan sebanyak 36 sampel (41,4%), stadium sedang sebanyak 21 sampel (24,1%) dan stadium berat 30 sampel (34,5%).
2. Gambaran stadium VFI pada pasien POAG di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada stadium normal sebanyak 25 sampel (28,7%), stadium *early defect* 17 sampel (19,6%), *moderate defect* 16 sampel (18,4%), dan *severe defect* 29 sampel (33,3%).
3. Terdapat hubungan yang sangat bermakna antara stadium POAG dengan stadium VFI pada pasien POAG di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2017-2019.

7.2 Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat dilakukan penelitian mengenai hubungan glaukoma primer sudut terbuka dengan RNFL mengingat keterkaitan RNFL dengan saraf optikus.
2. Ada lebih dari 100 pasien POAG yang terdaftar di rekam medik RSUP Dr. M. Djamil Padang dari tahun 2017-2019, namun hanya 49 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian secara prospektif sehingga jumlah sampel yang didapatkan bisa lebih banyak.