

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016-2019, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Usia pasien BPH yang mendapatkan terapi TURP paling banyak yaitu terdapat pada kelompok usia 61-70 tahun.
2. Seluruh indikasi pembedahan pada pasien BPH yang mendapatkan terapi TURP adalah indikasi mutlak, dengan indikasi mutlak terbanyak retensi berulang.
3. Volume prostat pasien BPH yang mendapatkan terapi TURP paling banyak yaitu terdapat pada kelompok ukuran >40-80 ml.
4. Pasien BPH yang mendapatkan terapi TURP paling banyak memiliki kadar *Prostate Spesific Antigen* yang tidak normal (> 4 ng/ml).
5. Pasien BPH yang mendapatkan terapi TURP paling banyak tidak memiliki riwayat pembedahan prostat sebelumnya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh derajat IPP, volume residu urin pada buli-buli pasca berkemih terhadap progresifitas gejala yang dimiliki pasien BPH.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pendidikan dan ekonomi terhadap indikasi pembedahan yang dimiliki pasien BPH.
3. Dianjurkan bagi pria berusia lanjut yang memiliki keluhan saluran kemih untuk melakukan serangkaian pemeriksaan yang terkait dengan pembesaran prostat agar terhindar dari komplikasi BPH lebih lanjut.