

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Pasien fraktur maksilofasial lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan pada kelompok usia 11 – 20 tahun
2. Jenis fraktur maksilofasial yang paling banyak terjadi yaitu fraktur mandibula
3. Etiologi terbanyak pada pasien fraktur maksilofasial yaitu keeclakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda motor
4. Perdarahan intrakranial yang terjadi pada pasien fraktur maksilofasial terbanyak yaitu perdarahan intraserebral
5. Tingkat GCS pasien fraktur maksilofasial terbanyak pada skala 13 – 15
6. Tidak terdapat hubungan lokasi fraktur maksilofasial dengan perdarahan intrakranial

7.2 Saran

1. Pada penelitian lebih lanjut dapat meneliti pada variabel yang belum diteliti seperti hubungan lokasi fraktur maksilofasial dengan tingkat GCS.
2. Perlu penelitian lebih lanjut dengan meneliti pengaruh penggunaan alat keselamatan seperti helm pada pengendara sepeda motor atau sabuk pengaman pada pengendara mobil yang dapat memengaruhi kejadian fraktur maksilofasial dan perdarahan intrakranial.