BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rerata skala REEDA pada luka insisi abdomen post Tindakan laparotomi obstetri/ginekologi yang diberikan VCO topikal di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah pada 24 jam yaitu 3,17 ± 1,04, pada 48 jam yaitu 2,11 ± 1,08, dan pada 72 jam yaitu 1,39 ± 0,85.
2. Rerata skala REEDA pada luka insisi abdomen post Tindakan laparotomi obstetri/ginekologi yang tidak diberikan VCO topikal di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah pada 24 jam yaitu 3,83 ± 0,99, pada 48 jam yaitu 3,11 ± 1,37, dan pada 72 jam yaitu 2,72 ± 1,41.
3. Terdapat hubungan penggunaan VCO topikal pada luka insisi abdomen post Tindakan laparotomi obstetri/ginekologi dengan skala REEDA 48 jam dan 72 jam post operasi.
4. Terdapat penurunan rerata skala REEDA yang lebih besar dari 24 ke 48 jam dan 48 ke 72 jam pada kelompok perlakuan (yang mendapatkan VCO topikal pada luka insisi post operasi).

7.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan :

1. Perlu dilakukannya penelitian lanjutan tentang hubungan VCO dengan faktor-faktor penyembuhan luka
2. Penggunaan VCO pada pasien post laparotomi obstetri/ginekologi dapat dipertimbangkan untuk diaplikasikan pada luka pasien post operasi untuk mempercepat penyembuhan luka.