

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian infusa air daun kelor pada itik Mojosari terhadap indeks kuning telur tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$), kadar protein telur pada hari ke-4 dan ke-8 tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$), namun pada hari ke-12 sangat nyata ($P<0,01$) meningkatkan kadar protein telur, lalu pada hari ke-16 dan ke-20 nyata ($P<0,05$) meningkatkan kadar protein telur, dan kadar lemak kuning telur menunjukkan hasil tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$). Pemberian infusa air daun kelor pada perlakuan D (5 gram/kg bb/hari) merupakan yang terbaik, dengan kadar protein telur 18,738% (hari ke-12), 19,307% (hari ke-16) dan 19,027% (hari ke-20).

5.2. Saran

Pada penelitian ini pemberian infusa air daun kelor 5 gr/kg bb/ hari merupakan yang terbaik dalam meningkatkan kadar protein telur. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai infusa air daun kelor kepada puyuh dan unggas lokal lainnya untuk meningkatkan kualitas telur.

