

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN IMUNISASI  
TETANUS TOKSOID CATIN PADA WUS DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS IKUR KOTO KOTA PADANG**



Diajukan ke Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Sarjana Kebidanan

Pembimbing :

1. dr. Desmiwarti, Sp. OG(K)
2. Erda Mutiara Halida, S.ST, M.Keb

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2021**


**BACHELOR OF MIDWIFERY PROGRAM  
FACULTY OF MEDICAL  
ANDALAS UNIVERSITY**

**Undergraduate Theses, August 2021**

**Cindy Maharani Putri. No.BP.1710333005**

**FACTORS AFFECTING THE COMPLETENESS OF TETANUS  
TOKSOID IMMUNIZATION PROSPECTIVE BRIDES IN WOMEN OF  
CHILDBEARING AGE IN THE WORK AREA OF IKUR KOTO PUBLIC  
HEALTH CENTER PADANG CITY**

xx + 129 pages, 23 tables, 1 pictures, 9 attachments



**Background and Objectives**

One of the causes of infant mortality in Indonesia is neonatal tetanus. Neonatorum Tetanus can be prevented with proper wound care and immunization Tetanus Toxoid (TT) is complete in women of childbearing age and women in pregnancy. In 2019 the coverage of tetanus toxoid immunization for non-pregnant women in the Ikur Koto Health Center area was (0.3%) of the total target of 3179 non-pregnant women of childbearing age. The purpose of this study was to determine the factors that affect the completeness of Tetanus Toxoid immunization for women of childbearing age in the Ikur Koto Health Center Work Area, Padang City.

**Method**

This research is analytic with case control observational method, conducted in the work area of the Ikur Koto Health Center from November 2020 to July 2021. The sample in this study was women of childbearing age who were married aged 15-49 years as many as 94 respondents. Samples were taken by purposive sampling technique. Data analysis was univariate and bivariate using chi-square analysis ( $p \leq 0.05$ ).

**Result**

The results showed that factors related to the completeness of TT immunization for prospective brides included education level ( $p=0.040$ ), knowledge level ( $p=0.000$ ), motivation ( $p=0.004$ ), attitude ( $p=0.001$ ) and support from health workers ( $p=0.000$ ). While the factor that did not have a significant relationship was age at marriage ( $p=1.237$ ).

**Conclusion**

There is no significant relationship between age at marriage and completeness of TT immunization for prospective brides, but there is a significant relationship between education level, level of knowledge, motivation, attitude and support of health workers..

**References** : 56 (2010– 2020)

**Keywords** : TT Immunization for prospective brides, Women of Childbearing Age, Age at Married, Education Level, Knowledge Level, Motivation, Attitude, Support of Health Workers.



**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Skripsi, 26 Agustus 2021**

**Cindy Maharani Putri. No.BP.1710333005**

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN IMUNISASI TT  
CATIN PADA WUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS IKUR KOTO  
KOTA PADANG**

xx+129 halaman, 23 tabel, 1 gambar, 9 lampiran

**ABSTRAK**

**Latar belakang dan Tujuan Penelitian**

Salah satu penyebab dari angka kematian bayi di Indonesia adalah *tetanus neonatorum*. *Tetanus Neonatorum* sebenarnya dapat dicegah dengan perawatan luka yang baik dan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) yang lengkap pada wanita usia subur (WUS) dan wanita hamil. Pada tahun 2019 cakupan imunisasi tetanus toksoid pada WUS tidak hamil di wilayah Puskesmas Ikur Koto yaitu sebanyak (0.3%) dari total sasaran WUS tidak hamil sebanyak 3179 orang. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi Tetanus Toksoid catin pada wanita usia subur (WUS) di Wilayah Kerja Puskesmas Ikur Koto Kota Padang.

**Metode**

Penelitian ini bersifat analitik dengan metode *observasional case control*, dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Ikur Koto dari bulan November 2020 sampai Juli 2021. Sampel dalam penelitian ini adalah Wanita Usia Subur menikah usia 15-49 tahun sebanyak 94 responden. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data secara univariat dan bivariate dengan menggunakan analisis *chisquare* ( $p \leq 0.05$ ).

**Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi TT catin meliputi tingkat pendidikan ( $p=0.040$ ), tingkat pengetahuan ( $p=0.000$ ), motivasi ( $p=0.004$ ), sikap ( $p=0.001$ ) dan dukungan tenaga kesehatan ( $p=0.000$ ). Sedangkan faktor yang tidak memiliki hubungan bermakna adalah umur menikah ( $p=1.237$ ).

**Kesimpulan**

Tidak terdapat hubungan bermakna antara umur menikah dengan kelengkapan imunisasi TT catin, namun terdapat hubungan bermakna pada tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, motivasi, sikap dan dukungan tenaga kesehatan.

**Daftar Pustaka** : 56 (2010– 2020)

**Kata Kunci** : Imunisasi TT Catin, WUS, Umur Menikah, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan, Motivasi, Sikap, Dukungan Tenaga Kesehatan

