

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

- 1. Pasien IMA-EST anterior yang menjalani IKPP di laboratorium kateterisasi jantung RSUP DR. M. Djamil Padang pada penelitian ini mayoritas berjenis kelamin laki-laki, dengan faktor resiko yang signifikan adalah hipertensi, merokok, dan dislipidemia.**
- 2. Rerata nilai RWPT pada pasien IMA-EST anterior yang menjalani IKPP pada penelitian ini normal.**
- 3. Rerata nilai QuBE pasien IMA-EST anterior yang menjalani IKPP pada penelitian ini normal.**
- 4. Terdapat perbedaan yang signifikan antar rerata RWPT dengan nilai QuBE rendah dan nilai QuBE normal pada pasien IMA-EST anterior yang telah menjalani IKPP**

#### **6.2 Saran**

- 1. Pemeriksaan RWPT dapat dipakai sebagai alat bantu memperkirakan adanya OMV untuk meningkatkan strategi tatalaksana pasien IMA-EST menjadi lebih baik.**
- 2. Penelitian lebih lanjut memakai pemeriksaan diagnostik baku emas untuk menilai obstruksi mikrovaskuler, yaitu CMR.**

