

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

#### **7.1. Kesimpulan**

1. Efikasi transfusi pada pasien yang mendapat transfusi PRC *leukodepleted* yaitu sebesar 0,95.
2. Efikasi transfusi pada pasien yang mendapat transfusi PRC *non-leukodepleted* yaitu sebesar 0,81.
3. Terdapat peningkatan yang bermakna efikasi transfusi pada pasien yang mendapat transfusi PRC *leukodepleted* dibandingkan pasien yang mendapat transfusi PRC *non-leukodepleted*.
4. Selisih kadar antibodi IgG pada pasien yang mendapat transfusi PRC *leukodepleted* yaitu 474 mg/dl.
5. Selisih kadar antibodi IgG pada pasien yang mendapat transfusi PRC *non-leukodepleted* yaitu 14 mg/dl.
6. Terdapat penurunan yang bermakna selisih kadar antibodi IgG pada pasien AIHA yang mendapatkan transfusi PRC *leukodepleted* dibandingkan dengan pasien AIHA yang mendapatkan transfusi PRC *non-leukodepleted*.

#### **7.2. Saran**

1. Perlu dipertimbangkan pemberian transfusi PRC *leukodepleted* pada pasien AIHA yang membutuhkan transfusi PRC.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh transfusi PRC *leukodepleted* terhadap efikasi transfusi dan antibodi IgG.