

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Kejadian TED tanpa protusio (NOSPECS I-II) dan TED dengan protusio (NOSPECS III-IV) terbanyak dengan pada usia di atas 50 tahun dengan jenis kelamin perempuan.
2. Terdapat perubahan rerata ketebalan RNFL peripapil nervus optikus pada TED dengan protusio (NOSPECS III-IV) lebih tipis dibandingkan dengan TED tanpa protusio (NOSPECS I-II).
3. Terdapat perubahan pola defek lapang pandang dan rerata nilai VFI lebih rendah pada TED dengan protusio (NOSPECS III-IV) dibandingkan dengan TED tanpa protusio (NOSPECS I-II).
4. Terdapat hubungan yang kuat antara rerata ketebalan RNFL peripapil nervus optikus dengan pola defek lapang pandang dan nilai VFI, dimana semakin tipis rerata ketebalan RNFL maka semakin luas pola defek lapang pandang dan menurun nilai VFI pada TED dengan protusio (NOSPECS III-IV).

7.2 Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memperhitungkan riwayat lama menderita hipertiroid, riwayat merokok dan pemeriksaan *imaging* untuk menilai volume intraorbita terutama pada TED dengan protusio (NOSPECS III-IV).