

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Rerata kadar NT-proBNP pasien gagal ginjal diabetik yang menjalani hemodialisis adalah 13,23 (3,08) ng/mL.
2. Rerata kadar NT-proBNP pasien gagal ginjal non-diabetik yang menjalani hemodialisis adalah 13,30 (6,13) ng/mL.
3. Tidak didapatkan perbedaan kadar NT-proBNP pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis berdasarkan kejadian diabetes melitus tipe 2.

7.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pada pasien gagal ginjal diabetik dan non-diabetik yang menjalani hemodialisis berdasarkan IMT.
2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pada pasien gagal ginjal diabetik dan non-diabetik yang menjalani hemodialisis berdasarkan fraksi ejeksi ventrikel kiri yang diperiksa dengan ekokardiografi.
3. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan desain kohort tentang NT-proBNP untuk menilai prognosis pasien gagal ginjal diabetik dan non-diabetik yang menjalani hemodialisis.
4. Pemeriksaan NT-proBNP dilakukan untuk setiap pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis.