

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1.1 Simpulan

1. Terdapat perbedaan kadar IL-6 pasien COVID-19 yang dirawat di ICU dan non ICU, kadar IL-6 pasien rawat ICU lebih tinggi di banding non ICU.
2. Terdapat perbedaan kadar feritin pasien COVID-19 yang dirawat di ICU dan non ICU, kadar feritin pasien rawat ICU lebih tinggi di banding non ICU.
3. Terdapat perbedaan jumlah leukosit pasien COVID-19 yang dirawat di ICU dan non ICU, jumlah leukosit pasien rawat ICU lebih tinggi di banding non ICU.
4. Terdapat perbedaan jumlah neutrofil pasien COVID-19 yang dirawat di ICU dan non ICU, jumlah neutrofil pasien rawat ICU lebih tinggi di banding non ICU.
5. Terdapat perbedaan jumlah limfosit pasien COVID-19 yang dirawat di ICU dan non ICU, jumlah limfosit pasien rawat ICU lebih rendah di banding non ICU.
6. Tidak terdapat perbedaan jumlah trombosit pasien COVID-19 yang dirawat di ICU dan non ICU.
7. Faktor yang paling berperan terhadap keparahan pasien COVID-19 yang dirawat di ICU dan non ICU yaitu feritin.

7.2 Saran

Diperlukan penelitian lanjutan dengan mengeksklusi penyakit penyerta.