

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Gambaran Perluasan Karsinoma Nasofaring Stadium Lanjut Berdasarkan *CT Scan* di RSUP Dr. M. Djamil Padang Periode 2019-2020 didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi karsinoma nasofaring berdasarkan perluasan ke jaringan sekitar pada T3 terbanyak adalah infiltrasi ke sinus paranasal, terutama sinus sfenoid.
2. Distribusi karsinoma nasofaring berdasarkan perluasan ke jaringan sekitar pada T4 terbanyak adalah ekstensi ke daerah intrakranial.

6.2 Saran

1. Kepada masyarakat nantinya diharapkan lebih peduli untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai gejala-gejala yang berkaitan dengan karsinoma nasofaring agar bisa segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan kepastian diagnosis sehingga dapat ditatalaksana lebih awal. Hal ini diharapkan dapat menurunkan jumlah penderita yang datang ke fasilitas kesehatan dengan karsinoma nasofaring stadium lanjut.
2. Kepada dokter nantinya diharapkan untuk bisa lebih *aware* terhadap tindakan deteksi dini dari karsinoma nasofaring karena gejalanya yang tidak khas sehingga lebih banyak pasien yang bisa terdiagnosis lebih awal yang nantinya juga berpengaruh terhadap faktor prognosinya.
3. Kepada pemerintah dan dinas terkait nantinya diharapkan bisa berinisiasi melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait karsinoma nasofaring dan juga diharapkan nantinya masyarakat dapat dipermudah akses ketersediaan pelayanan dan fasilitas kesehatan agar pasien dapat diskruining lebih awal dan tidak perlu melewati prosedur yang rumit dan lama untuk penegakkan diagnosis ini.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan perbandingan dan referensi.