

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kelangsungan hidup yang terjadi setelah brakiterapi LDR dan HDR pada pasien knaker serviks stadium IIB-IIB tidak berbeda bermakna.
2. Kontrol lokal setelah brakiterapi LDR dan HDR pada wanita dengan kanker serviks stadium IIB-IIIA menunjukkan hasil yang tidak berbeda bermakna sedangkan pada kanker serviks stadium IIIB kontrol lokal brakiterapi HDR lebih rendah dibandingkan dengan brakiterapi LDR.
3. Komplikasi yang terjadi setelah brakiterapi HDR pada wanita dengan kanker serviks stadium IIB-IIIB adalah gastrointestinal dan genitourinari.

5.2 Saran

1. Perlunya penelitian yang membahas brakiterapi LDR yang lebih luas dan mendalam agar dapat dibandingkan dengan brakiterapi HDR sehingga mendapat hasil yang lebih baik.
2. Penelitian brakiterapi LDR dan HDR pada pasien kanker serviks stadium IIB-IIIB dengan waktu *follow-up* yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Penelitian dengan randomisasi lebih lanjut untuk menghindari risiko timbulnya bias dalam penelitian.